

Примечания:

(прим. 1) Первая, вторая и третья вакцинации проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации), за исключением детей, относящихся к группам риска, вакцинация против вирусного гепатита В которых проводится по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).

(прим. 2) Вакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тыс. населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ).

(прим. 3) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (родившимся от матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или большой острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами).

(прим. 4) Первая и вторая вакцинации проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).

(прим. 5) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка). (сноска в ред. Приказа Минздрава России от 13.04.2017 N 175н)

(прим. 6) Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям вакциной для профилактики полиомиелита (живой); детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка) - вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной). (сноска в ред. Приказа Минздрава России от 13.04.2017 N 175н)

(прим. 6.1) Вакцинация и ревакцинация детям, относящимся к группам риска, может осуществляться иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, содержащими комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды.

(сноска введена Приказом Минздрава России от 13.04.2017 N 175н)

(прим. 7) Вторая ревакцинация проводится анатоксинами с уменьшенным содержанием антигенов.

(прим. 8) Ревакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ).

(прим. 9) Вакцинация проводится детям и взрослым, ранее не привитым против вирусного гепатита В, по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).

(прим. 10) Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев.

Профилактические прививки осуществляются в рамках Национального календаря прививок, который представляет собой систему наиболее рационального их проведения, обеспечивая развитие иммунитета в самом раннем возрасте в максимально короткие сроки.



Благодаря прививкам спасены миллионы детей, получивших право на здоровую жизнь. Прививка включает все механизмы защиты, предохраняющие организм от болезнетворного действия микробов и вирусов, организм становится невосприимчивым к болезни, против которой привит.

Помогите Вашему ребенку! Защитите его от инфекционных заболеваний и от вызываемых ими тяжелых осложнений и последствий!

**РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!
Здоровье и жизнь
Вашего ребенка зависят от Вас!**



Тиражировано в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Министерство здравоохранения Амурской области.
ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики».

г. Благовещенск, ул. Шимановского, 45, тел. 33-33-53.

www.aostpr.ru [@aostpr_blg](https://www.instagram.com/aostpr_blg)

Министерство здравоохранения Амурской области
ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики»

«КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК»



Благовещенск, 2019

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. N 125н

Национальный календарь профилактических прививок

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от
16.06.2016 N 370н, от 13.04.2017 N 175н)

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В (прим. 1)
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза (прим. 2)
Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В (прим. 1)
Дети 2 месяца	Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) (прим. 3) Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
Дети 3 месяца <6.1>	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Первая вакцинация против полиомиелита (прим. 4) Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) (прим. 5)
Дети 4,5 месяца <6.1>	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) (прим. 5) Вторая вакцинация против полиомиелита (прим. 4) Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 6 месяцев <6.1>	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Третья вакцинация против вирусного гепатита В (прим. 1) Третья вакцинация против полиомиелита (прим. 6) Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска) (прим. 5)	(в ред. Приказа Минздрава России от 13.04.2017 N 175н)	Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее	Вакцинация против вирусного гепатита В (прим. 9)
Дети 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) (прим. 3)	(в ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016 N 370н)	Дети от 1 года до 18 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Дети 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции			
Дети 18 месяцев <6.1>	Первая ревакцинация против полиомиелита (прим. 6) Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)	(в ред. Приказа Минздрава России от 13.04.2017 N 175н)	Дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори (прим. 10)
Дети 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита (прим. 6)	(в ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016 N 370н)		
Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита			
Дети 6-7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (прим. 7) Ревакцинация против туберкулеза (прим. 8)			
Дети 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка (прим. 7) Третья ревакцинация против полиомиелита (прим. 6)			
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации			

Примечания ➔