

Суррогаты вообще не предусматривают употребления внутрь, так как они представляют собой средства с содержанием спирта, используемые для бытовых нужд.

Виды суррогатов:

- одеколоны, лосьоны и др.;
- технические жидкости (тормозная жидкость, антифриз, стеклоочистители);
- метиловый спирт, этиленгликоль.

МЕТАНОЛ (CH₃OH)

Ядовитый технический спирт

Часто используется в суррогатном алкоголе. На вкус, запах и цвет неотличим от этилового спирта.

30–100 мл – смертельная доза

Спаси пострадавшего при этом удастся крайне редко. При большой дозе смерть наступает через 2–3 часа.

При отравлении метиловым спиртом нужно срочно обратиться к врачу. До приезда скорой помощи вызвать рвоту и промыть желудок.



В ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» можно получить анонимную консультацию.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»:

Амурская область, г. Благовещенск, улица Больничная, 32

Телефон регистратуры:

8 (4162) 77-67-03

Телефон доверия:

8-909-810-55-54

Телефон горячей линии (круглосуточно)

8 (4162) 77-67-07

Сайт: www.aond.ru

Почта: mail@aond.ru



Тиражировано в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2025 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Министерство здравоохранения Амурской области. ГБУЗ АО «Амурский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». г. Благовещенск, ул. Шимановского, 45, тел. 33-33-53.

www.aocmp.ru

[aocmp_blg](https://www.instagram.com/aocmp_blg)



Отпечатано в ООО «ИПК «ОДЕОН». 3. С-21-4365. Тираж 500. 2021 год.

Министерство здравоохранения Амурской области
ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»



ОТРАВЛЕНИЕ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ



Благовещенск, 2021

Суррогаты вообще не предусматривают употребления внутрь, так как они представляют собой средства с содержанием спирта, используемые для бытовых нужд.

Виды суррогатов:

- одеколоны, лосьоны и др.;
- технические жидкости (тормозная жидкость, антифриз, стеклоочистители);
- метиловый спирт, этиленгликоль.

МЕТАНОЛ (CH₃OH)

Ядовитый технический спирт

Часто используется в суррогатном алкоголе. На вкус, запах и цвет неотличим от этилового спирта.

30–100 мл – смертельная доза

Спаси пострадавшего при этом удастся крайне редко. При большой дозе смерть наступает через 2–3 часа.

При отравлении метиловым спиртом нужно срочно обратиться к врачу. До приезда скорой помощи вызвать рвоту и промыть желудок.



В ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» можно получить анонимную консультацию.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»:

Амурская область, г. Благовещенск, улица Больничная, 32

Телефон регистратуры:

8 (4162) 77-67-03

Телефон доверия:

8-909-810-55-54

Телефон горячей линии (круглосуточно)

8 (4162) 77-67-07

Сайт: www.aond.ru

Почта: mail@aond.ru



Тиражировано в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2025 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Министерство здравоохранения Амурской области. ГБУЗ АО «Амурский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». г. Благовещенск, ул. Шимановского, 45, тел. 33-33-53.


www.aocmp.ru

[aocmp_blg](https://www.instagram.com/aocmp_blg)



Отпечатано в ООО «ИПК «ОДЕОН». 3. С-21-4365. Тираж 500. 2021 год.

Министерство здравоохранения Амурской области
ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»



ОТРАВЛЕНИЕ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ



Благовещенск, 2021



ФОРМЫ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ

ОФТАЛЬМИЧЕСКАЯ (ГЛАЗНАЯ)

Пелена и яркие пятна перед глазами, снижение остроты зрения вплоть до полной слепоты.

Эти симптомы могут сочетаться с другими признаками поражения нервной системы.



ФОРМЫ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ

ОФТАЛЬМИЧЕСКАЯ (ГЛАЗНАЯ)

Пелена и яркие пятна перед глазами, снижение остроты зрения вплоть до полной слепоты.

Эти симптомы могут сочетаться с другими признаками поражения нервной системы.

КОМАТОЗНАЯ

Глубокая потеря сознания и всех рефлексов, нарушение сердечной и дыхательной деятельности с возможным смертельным исходом.

КОЛАПТОИДНАЯ

Развивается в течение 2–3 суток после приема. Чувство стеснения в грудной клетке, тахикардия, учащение дыхания, падение артериального давления, бледность, потливость, посинение губ.

Прогрессирующее нарушение дыхания приводит к смертельному исходу.

АНТИФРИЗ

(метиловый спирт + этиленгликоль)

Вызывает опьянение, но через 10–12 часов появляются признаки тяжелого отравления: головная боль, рвота, нарушение сознания, поражение зрительного нерва, необратимые изменения в печени.

КОМАТОЗНАЯ

Глубокая потеря сознания и всех рефлексов, нарушение сердечной и дыхательной деятельности с возможным смертельным исходом.

КОЛАПТОИДНАЯ

Развивается в течение 2–3 суток после приема. Чувство стеснения в грудной клетке, тахикардия, учащение дыхания, падение артериального давления, бледность, потливость, посинение губ.

Прогрессирующее нарушение дыхания приводит к смертельному исходу.

АНТИФРИЗ

(метиловый спирт + этиленгликоль)

Вызывает опьянение, но через 10–12 часов появляются признаки тяжелого отравления: головная боль, рвота, нарушение сознания, поражение зрительного нерва, необратимые изменения в печени.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ НАСТОЙКИ (боярышника, пустырника и др.)

Употребление лекарственных спиртосодержащих лекарственных настоек в немедицинских целях вызывает отравление, как при передозировке лекарственным препаратом, в целом схожее с отравлением этанолом. В первую очередь это – тошнота, рвота, боли в животе, диарея, недомогание, общая слабость, нарушение координации движений, вялость, сонливость, нарушение сознания.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ НАСТОЙКИ (боярышника, пустырника и др.)

Употребление лекарственных спиртосодержащих лекарственных настоек в немедицинских целях вызывает отравление, как при передозировке лекарственным препаратом, в целом схожее с отравлением этанолом. В первую очередь это – тошнота, рвота, боли в животе, диарея, недомогание, общая слабость, нарушение координации движений, вялость, сонливость, нарушение сознания.