

Шкала SCORE не используется, если у вас:

- сердечно-сосудистые заболевания, в основе которых атеросклероз сосудов;
- сахарный диабет I и II типа;
- очень высокие уровни артериального давления и/или общего холестерина;
- хроническая болезнь почек.

При наличии этих состояний сердечно-сосудистый риск считается **ВЫСОКИМ** и **ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ**.

Людям с умеренным и особенно с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском необходимы активные мероприятия для снижения факторов риска.



Желаем вам здоровья!



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АМИ

Российское агентство медико-социальной информации АМИ
для Министерства здравоохранения Российской Федерации



www.aoscmp.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!



Национальные
программы
России



Национальные
программы
России

Тиражировано ГБУЗ АО «Амурский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 45. www.aoscmp.ru

Отпечатано в ООО «ИПК «ОДЕОН», т. 51-81-81, Заказ С-22-3986, Тираж 100, 2022 год.




Материал разработан
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины»
Минздрава России



Определите
ваш суммарный
сердечно-сосудистый
РИСК

Суммарный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет (Шкала SCORE)



Суммарный риск SCORE ≥ 5 считается высоким

Например:

— если вы мужчина, 50 лет, курящий, с уровнем систолического (верхнего) АД 160 мм рт.ст. и уровнем общего холестерина 5 ммоль/л, то ваш риск по Шкале SCORE — 6%, т. е. **ВЫСОКИЙ**.

— Если вы откажетесь от курения, то ваш **риск** по Шкале SCORE уменьшится **вдвое** и составит 3%, т. е. риск станет **УМЕРЕННЫМ**.

— Если, бросив курить, вы еще и достигнете целевых уровней артериального давления, т. е. **менее 140/90 мм рт.ст.** — **риск** по Шкале SCORE составит 1%, т. е. ваш риск — **НИЗКИЙ**.

МУЖЧИНЫ

НЕКУРЯЩИЕ		КУРЯЩИЕ								
140	14	16	19	22	26	26	30	35	41	47
120	9	11	13	15	16	18	21	25	29	34
100	6	8	9	11	13	13	14	17	20	24
80	4	5	6	7	9	9	10	12	14	17

НЕКУРЯЩИЕ		КУРЯЩИЕ								
180	9	11	13	15	18	18	21	24	28	33
160	6	7	9	10	12	12	14	17	20	24
140	4	5	6	7	9	8	10	12	14	17
120	3	3	4	5	6	6	7	8	10	12

НЕКУРЯЩИЕ		КУРЯЩИЕ								
180	6	7	8	10	12	12	13	16	19	22
160	4	5	6	7	8	8	9	11	13	16
140	3	3	4	5	6	5	6	8	9	11
120	2	2	3	3	4	4	4	5	6	8

НЕКУРЯЩИЕ		КУРЯЩИЕ								
180	4	4	5	6	7	7	8	10	12	14
160	2	3	3	4	5	2	3	3	4	5
140	1	1	2	2	2	1	2	2	2	3
120	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

НЕКУРЯЩИЕ		КУРЯЩИЕ								
180	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4
160	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
140	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
120	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

СИСТОЛИЧЕСКОЕ АД (ММ РТ. СТ.)

150 200 250 300

4 5 6 7 8

ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН ТАБЛИЦА РИСКА SCORE

ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН ШКАЛА ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА

НЕКУРЯЩИЕ		КУРЯЩИЕ								
180	3	3	4	5	6	6	7	8	10	12
160	2	3	3	4	4	4	5	6	7	8
140	1	2	2	2	3	3	3	4	5	6
120	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4

СИСТОЛИЧЕСКОЕ АД (ММ РТ. СТ.)

150 200 250 300

4 5 6 7 8

ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН ШКАЛА ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА

© 2007 ESC

Однозначных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний не существует, однако установлены предрасполагающие факторы. Их принято называть факторами риска.

Факторы риска взаимосвязаны и усиливают действие друг друга, поэтому врачи определяют суммарный сердечно-сосудистый риск. Сделать это можно по Шкале SCORE, которая применяется во всех европейских странах, в том числе в России.

Шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) позволяет оценить риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет. Рекомендуется использовать Шкалу SCORE для людей в возрасте 40 лет и старше.

Для определения сердечно-сосудистого риска по Шкале SCORE необходимо знать возраст и пол человека, уровень общего холестерина и уровень систолического (верхнего) артериального давления, а также — курит человек или нет.

Как использовать Шкалу SCORE

Вначале выберите подходящую вам сторону Шкалы. Левая отражает риск для женщин, правая — для мужчин.

Выберите горизонтальные столбцы, соответствующие вашему возрасту (40 лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет и 65 лет).

Каждому возрасту соответствуют два столбца: левый столбец относится к некурящим, правый — к курящим. Выберите тот, который относится к вам.

Каждый столбец разделен на четыре горизонтальных строки, соответствующие уровню систолического (верхнего) артериального давления (120 мм рт. ст., 140 мм рт. ст., 160 мм рт. ст., 180 мм рт. ст.), и пять вертикальных столбцов, соответствующих уровню общего холестерина (4 ммоль/л, 5 ммоль/л, 6 ммоль/л, 7 ммоль/л, 8 ммоль/л).

В выбранном вами столбце найдите ячейку, соответствующую вашему уровню систолического (верхнего) артериального давления и уровню общего холестерина. Цифра в данной ячейке указывает на ваш суммарный сердечно-сосудистый риск.

Риск менее 1% считается НИЗКИМ
в пределах ≥ 1 до 5 % — УМЕРЕННЫМ
≥ 5 до 10 % — ВЫСОКИМ
≥10 % — ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ

Пользуясь этой Шкалой, вы можете определить, насколько ваш сердечно-сосудистый риск выше минимального. Минимальный сердечно-сосудистый риск имеют некурящие люди с уровнем артериального давления 120/80 мм рт. ст. и общего холестерина — 4 ммоль/л.